

分娩後の出血に伴う異常を早期に認知するために ～児娩出直後からのバイタルサイン測定と推移の評価～

11:00

HR 100
Bp 110/70
SpO₂ 98

15分前より心拍数が増えている…後陣痛が強いのかな

ちょっと手が冷たい

出血は520mlかそろそろ止まるかな

10:45

HR 85
Bp 110/65
SpO₂ 99

出血量が400mlあったけどバイタルは正常

10:30

助産師A

HR 80
Bp 110/60
SpO₂ 99

はい

15分ごとに血圧などを測っています
このままモニタを付けさせてください

○月△日 10時児娩出
10時15分胎盤娩出

酸素投与
バイタルは5分ごと
2本目のルート
確保してください
すぐに行きます

わかりました

○月△日	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00
BP	110/70	110/65	110/60	110/70	110/70
HR	80	85	85	85	100
RR	20	20	20	20	20
T	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5
SpO ₂	99	99	99	99	98
末梢循環不全	なし	なし	なし	なし	末梢冷感
意識レベル	会話可	会話可	会話可	会話可	会話可
出血量(ノ累計)			400		120/520 たらたら
子宮底	臍高	臍高	臍高	臍高	臍高
硬 度	良好	良好	良好	やや不良	

出血が
続いているし
心拍数も呼吸数も
増えているから

先生に
報告するね！

助産師B

心拍数が
増えているけど
出血量は
どのくらい？

トータル
520mlです

はい
まだ出てます！

警告ラインよ！
出血はまだ
続いているの？

500ml以上だから

※提言第21号の3頁をご参照ください

私も経時的に
バイタルを測定する
だけではなく
その推移を評価することの
大切さがわかりました

バイタルと出血量を
測ってくれていたから
すぐに気付いて
搬送することが
できたわ

酸素

モニタ

HR 110
Bp 100/60
SpO₂ 98

2本のルート

出血量が
1000mlに達し
持続出血を
認めていたため

ただちに高次医療
施設へ搬送した

異常を早期に認知するためには、バイタルサインと出血量の推移を総合的に評価することが重要です。

詳細については、医療事故調査・支援センターのホームページにある医療事故の再発防止に向けた
提言第21号「産科危機的出血に係る妊産婦死亡事例の分析」をご確認ください。
この漫画は、モーションコミック(マンガ動画)でも紹介しています。研修等にご活用ください。

提言第21号

